

ГОРНОЕ ДЕЛО И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 517.962.2, 517.968.22

**КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СРЕДЫ В
ОДНОМЕРНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ СЕЙСМИКИ**

Алимканов Амангельди Арапбаевич, аспирант, ст.преп., ОшТУ им. академика М.М. Адышева, Кыргызстан, Ош, ул. Н.Исанова 81, Моб. 0554554954, dr.amangeldy78@mail.ru

Сатыбаев Абдуганы Джунусович, д.ф.-м.н., профессор, ОшТУ им. академика М.М. Адышева, Кыргызстан, Ош, ул. Н.Исанова 81, Моб. 0553080408, abdu-satybaev@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрена одномерная обратная задача сейсмики, в которой определена плотность среды. Задача сведена к обратной задаче с данными на характеристиках. Построено конечно-разностное решение обратной задачи, показана сходимость этого решения к точному решению.

Ключевые слова. Уравнение сейсмики, обратная задача, плотность среды, конечно-разностное решение, сходимость.

**FINITE-DIFFERENCE DETERMINATION OF THE DENSITY OF THE MEDIUM
IN ONE-DIMENSIONAL INVERSE PROBLEM OF SEISMIC**

Alimkanov Amangeldi Arapbaevich, post-graduate student, senior lecturer., OshTU named after academician M.M. Adysheva, Kyrgyzstan, Osh, st. N. Isanova 81, Mob. 0554554954, dr.amangeldy78@mail.ru

Satybaev Abdugany Dzhunusovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, OshTU named after academician M.M. Adysheva, Kyrgyzstan, Osh, st. N.Isanova 81, Mob. 0553080408, abdu-satybaev@mail.ru

Abstract. This article describes the one-dimensional seismic inverse problem, which defines the density of the medium. The problem is reduced to inverse problem with data on characteristics. The finite-difference solution shows the convergence of this solution to the exact solution.

Keywords. The equation of the seismic inverse problem, the density of the medium, finite-difference solution convergence.

Введение. Исследования внутреннего строения Земли и распространения в ней сейсмических волн, процессов состоит из двух основных этапов: наблюдения поля сейсмических волн; интерпретация полученных данных.

При интерпретации сейсмических наблюдений требуется определить внутреннее строение среды Земли по колебаниям поверхности среды, которые происходят под действием источников (землетрясения, искусственные взрывы, вулканы и другие) [4].

Самым простым, в то время наглядно описывающим процессом распространения сейсмических волн является волновое уравнение. Поэтому решение как прямых так и обратных задач для волнового уравнения почти наглядно демонстрирует происхождения сейсмических волн в среде [1].

Классическим способом изучения прямых и обратных динамических сейсмических задач в неоднородной среде является метод линеаризации многомерных задач [3].

Смысл одномерной и многомерной линеаризованной задачи состоит в том, что решение последней задачи мало, слабо отличается от решения одномерной задачи, это имеет место как в прямых задачах так и в обратных задачах. Поэтому решение общей задачи состоит из решений одномерной и многомерно – линеаризованной задач, и конечно это еще необходимо установить, доказать строго математически.

Построения численных решений одномерных и линеаризовано многомерных (прямых, обратных) задач, разработка алгоритмов, создание комплекса программ и получение численных расчетов и графиков и их обоснования представляет большой интерес с точки зрения сейсмических приложений [2].

1. Постановка задачи. Одномерная прямая задача сейсмологии заключается в определении $u_0(x_3, t)$ – смещения почв из задачи

$$\rho_0(x_3) \frac{\partial^2 u_0(x_3, t)}{\partial t^2} = \mu_0(x_3) \frac{\partial^2 u_0}{\partial x_3^2} + \mu_{0,x_3}(x_3) \frac{\partial u_0(x_3, t)}{\partial x_3}, \quad x_3 \in R_+, t \in R_+, \quad (1)$$

$$u_0(x_3, t) \Big|_{t < 0} \equiv 0, \quad \mu_0(x_3) \frac{\partial u_0(x_3, t)}{\partial x_3} \Big|_{x_3} = -r_0 \delta(t), \quad t \in R_+, \quad (2)$$

где $\rho_0(x_3)$ – плотность среды, $\mu_0(x_3)$ – коэффициент Ламе известные функции, $\delta(t)$ – дельта функция Дирака.

Обратная задача заключается в определении $\rho_0(x_3)$ – плотность среды, при известной функции $\mu_0(x_3)$ и дополнительной информации вида

$$u_0(x_3, t) \Big|_{x_3=0} = f(t), \quad t \in [0, T], \quad (3)$$

Отметим, что обратная задача (1)-(3) возникла при линеаризации двумерной обратной задачи сейсмологии [см. 5]. Пусть выполнено условие

$$\mu_0(x_3), \rho_0(x_3) \in \Lambda_0, \quad (4)$$

$$\Lambda_0 = \left\{ \rho_0(x) \in C^6(R_+), \rho_0(+0) = 0, 0 < M_1 \leq \rho_0(x) \leq M_2, \|\rho_0\|_{C^2} \leq M_3 \right\},$$

M_1, M_2, M_3 – положительные постоянные.

2. Приведем к обратной задаче с данными на характеристиках.

Введем новую переменную $x = \int_0^{x_3} \frac{d\Sigma}{\sqrt{\mu_0(\Sigma) / \rho(\Sigma)}}$ и новые функции

$$u(x, t) = u_0(x_3, t), a(x) = \rho_0(x_3), c(x) = \mu_0(x_3).$$

Тогда из обратной задачи (1)-(3) имеем следующую обратную задачу

$$\left. \begin{aligned} u(x, t) &= u_{xx}(x, t) + \frac{1}{2} \left(\frac{a'(x)}{a(x)} + \frac{c'(x)}{c(x)} \right) u_x(x, t), \quad x, t \in R_+, \\ u(x, t) \Big|_{t < 0} &\equiv 0, \quad \frac{a(0)}{c(0)} u_x(x, t) \Big|_{x=0} = -r_0 \delta(t), \quad t \in R_+, \\ u(x, t) \Big|_{x=0} &= f(t), \quad t \in [0, T] \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Здесь неизвестной является функция $a(x)$.

Продолжим теперь все $a(x)$, $c(x)$ и $u(x, t)$ четным образом по переменной x на полупространство $x \in R_-, R = \{x \in R : x < 0\}$.

В силу условия (3), (4) и принципа конечной зависимости области решения гиперболического уравнения от области определения его коэффициентов и от области данных можно ограничиться рассмотрением обратной задачи (5) в области

$$\Delta(T) = \left\{ (x, t) \in (R \times R_+) : x \in (0, \frac{T}{2}), |x| < t < T - |x| \right\}.$$

Для выделения особенностей решения задачи (5) представим решение прямой задачи в виде

$$u(x, t) = \tilde{u}(x, t) + S(x)\theta(t - |x|), \quad x \in R, \quad t \in R_+, \quad (6)$$

где $\tilde{u}(x, t)$ - гладкая непрерывная функция, $\theta(t)$ - тета функция Хевисайда. Вычислим

$$u_{tt}(x, t) = \tilde{u}_{tt}(x, t) + S(x)\delta'(t - |x|), \quad u_x(x, t) = \tilde{u}_x(x, t) + S'_x(x)\theta(t - |x|) - S(x)\delta(t - |x|),$$

$$u_{xx}(x, t) = \tilde{u}_{xx}(x, t) + S''_{xx}(x)\theta(t - |x|) - 2S'_x(x)\delta(t - |x|) + S(x)\delta'_x(t - |x|), \quad (7)$$

Подставляя последние выражения в уравнения (5) и собирая одинаковые функции при $\theta(t - |x|), \delta(t - |x|), \delta'(t - |x|)$, получим обратную задачу относительно $S(x)$:

$$\left. \begin{aligned} u_{tt}(x, t) &= u_{xx}(x, t) - \frac{2S'_x(x)}{S(x)}u_x(x, t), \quad (x, t) \in \Delta(T), \\ u(x, t) \Big|_{t=|x|} &= S(x), \quad x \in \left[0, \frac{T}{2}\right], \\ u(x, t) \Big|_{x=0} &= f(t), \quad t \in [0, T] \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Находим связь между функциями $S(x)$ и $a(x), c(x)$. При одинаковых $\delta'(t - |x|)$

получим $-2S'_x(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{a'(x)}{a(x)} + \frac{c'(x)}{c(x)} \right) S(x)$, отсюда

$$\frac{S'(x)}{S(x)} = -\frac{1}{4} \left(\frac{a'(x)}{a(x)} + \frac{c'(x)}{c(x)} \right), \quad \text{проинтегрируем}$$

$$\ln S(x) = -\frac{1}{4} [\ln a(x) + \ln c(x)] + C_2 = -\frac{1}{4} [\ln a(x) \cdot c(x)] + \ln C_1 =$$

$$= \ln \left[a(x) \cdot c(x)^{-\frac{1}{4}} \right] + \ln C_1 = \ln \left[(a(x) \cdot c(x))^{-\frac{1}{4}} * C \right]. \quad \text{Здесь } C_2, C_1, C - \text{положительные}$$

постоянные. Отсюда $S(x) = C * \sqrt[4]{\frac{1}{a(x) \cdot c(x)}}$, определим постоянную C .

$$S(o) = C * \sqrt[4]{\frac{1}{a(o) \cdot c(o)}} = r_o \cdot \frac{c(o)}{a(o)}; \quad \text{Отсюда}$$

$$C = r_o \frac{c(o)}{a(o)} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{\frac{1}{a(o) \cdot c(o)}}} = r_o \cdot \frac{c(o)}{a(o)} \cdot \sqrt[4]{a(o) \cdot c(o)}. \quad \text{Тогда}$$

$$S(x) = r_o \frac{c(o)}{a(o)} * \sqrt[4]{\frac{a(o) \cdot c(o)}{a(x) \cdot c(x)}}, \quad (9)$$

3. Конечно-разностное решение.

Теорема. Пусть для функции $f(t) \in C^4[0, T]$ существует решение обратной задачи (1)-(3) удовлетворяющее условию (4) и пусть решение прямой задачи (1)-(2) $u(x, t) \in C^4(\Delta(t))$. Тогда при малом T приближенное решение обратной задачи, построенной конечно-разностным методом, сходится к точному обратной задачи в классе C со скоростью порядка $O(h)$.

Доказательство. Введем сеточную область

$$\Delta_h(T) = \{x_1 = ih, t_k = kh, (ih, kh): h = T/2N, ih \in (0, T/2), i = \overline{1, N}, ih \leq kh \leq T - ih\} \quad (10)$$

где h – сеточный шаг по x, t .

Используя конечно-разностные обозначения, составим разностную схему для обратной задачи (8)

$$\left. \begin{aligned} u_{\bar{t}\bar{t}}(ih, kh) = u_{\bar{x}\bar{x}}(ih, kh) - 2 \frac{S_0(ih)}{\frac{x}{S_i + S_{i-2}}} \cdot u_0(ih, kh) + O(h), \quad (ih, kh) \in \Delta_h(T), \quad u_i^i = S_i, \quad i = \overline{0, N} \\ u_i^i = S_i, \quad i = \overline{0, N} \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

$$u_0^k = f^k, \quad k = \overline{0, 2N}. \quad (12)$$

Исследуем в начале сходимости обратной задачи (11)-(12) к точному решению обратной задачи (8). Для этого распишем разностное уравнение

$$u_{i+1}^k = u_i^{k+1} + u_i^{k-1} - u_{i-1}^k + h^2 B_i^k, \quad \text{где } B_i^k = \frac{S_i - S_{i-2}}{h^2} \cdot \frac{4}{S_i + S_{i-2}} \cdot (u_i^k - u_{i-2}^k). \quad (13)$$

Последовательно подставляя в правую часть последнего уравнения выражения $u_i^{k+1}, u_i^{k-1}, u_{i-1}^{k-2}$, получим

$$u_{i+1}^k = \frac{1}{2} [f^{k+i+1} + f^{k-i-1}] + h^2 \sum_{\rho=1}^i \sum_{\mu=1}^{\rho} B_{\mu}^{k-i-\mu+2\rho}. \quad (14)$$

Полагая в (14) $k=i+1$ и учитывая вторую формулу (11) получим

$$S_{i+1} = \frac{1}{2} [f^{2i+2} + f^0] + h^2 \sum_{\rho=1}^i \sum_{\mu=1}^{\rho} B_{\mu}^{1-\mu+2\rho}. \quad (15)$$

Из (14) следует

$$u_i^k = \frac{1}{2}(f^{k+i} + f^{k-i}) + h^2 \sum_{\rho=1}^{i-1} \sum_{\mu=1}^{\rho} B_k^{k-i-\mu+2\rho+1} \quad (16)$$

$$u_{i-2}^k = \frac{1}{2}(f^{k+i-2} + f^{k-i+2}) + h^2 \sum_{\rho=1}^{i-3} \sum_{\mu=1}^{\rho} B_{\mu}^{k-i-\mu+2\rho+3} \quad (17)$$

Откуда

$$\frac{u_i^k - u_{i-2}^k}{h} = \frac{1}{2h}(f^{k+i} - f^{k+i-2} + f^{k-i} + f^{k-i+2}) + h \sum_{\mu=1}^{i-1} B_{\mu}^{k-i-\mu+1} + h \sum_{\mu=1}^{i-1} B_{\mu}^{k+i-\mu-1}, \quad (18)$$

а из (16) и (17) следует

$$S_i = \frac{1}{2}[f^{2i} + f^0] + h^2 \sum_{\rho=1}^{i-1} \sum_{\mu=1}^{\rho} B_{\mu}^{1-\mu+2\rho}, \quad (19)$$

$$S_{i-2} = \frac{1}{2}[f^{2i-4} + f^0] + h^2 \sum_{\rho=1}^{i-3} \sum_{\mu=1}^{\rho} B_{\mu}^{1-\mu+2\rho} \quad (20)$$

Следовательно,

$$\frac{S_i - S_{i-2}}{h} = \frac{1}{2h}(f^{2i} - f^{2i-4}) + h \sum_{\mu=1}^{i-1} B_{\mu}^{2i-\mu-1} + h \sum_{\mu=1}^{i-3} B_{\mu}^{2i-\mu-3} \quad (21)$$

Введем следующие обозначения

$$F_i^k = \frac{1}{2} * \begin{pmatrix} f^{k+1} + f^{k-i} \\ \frac{1}{h}(f^{k+1} - f^{k+i-2} + f^{k-i} + f^{k-i+2}) \\ f^{2i} + f^0 \\ \frac{1}{h}(f^{2i} - f^{2i-4}) \end{pmatrix} \quad (22)$$

$$\Phi_i^k = \begin{pmatrix} u_i^k \\ \frac{u_i^k - u_{i-2}^k}{h} \\ S_i \\ \frac{S_i - S_{i-2}}{h} \end{pmatrix} \quad (23)$$

и введем оперативное выражение

$$A[\Phi_p^k] = \begin{pmatrix} h \sum_{\mu=1}^p B_k^{k-i-\mu+2p+1} \\ B_p^{k-i+p+1} + B_p^{k+i-\mu-1} \\ h \sum_{\mu=1}^p B_\mu^{1-\mu+2p} \\ B_p^{2i-p-1} + B_{p-1}^{2i-p-2} - B_o^{2i-3} \end{pmatrix} \quad (24)$$

Тогда из (16), (18), (19), (21) следует

$$\Phi_i^k = F_i^k + h \sum_{p=1}^{i-1} A[\Phi_p^k]. \quad (25)$$

(25) является нелинейной замкнутой системой разностных уравнений. Из (25), используя дискретный аналог Гронуолла-Беллмана. Определяя $S(x)$ определим $a(x)$ по формуле (9), затем определим плотность функции $\rho_0(x_3)$ по известной $a(x)$.

Список литературы

1. Артемьев А.Е. Физические основы сейсморазведки. – Саратов: ООО «ИЦ Наука», 2012г.-56 с.
2. Кабанихин С.И. Обратные и некорректные задачи. Новосибирск: Сибирское научное издательство. 2009г. – 457с.
3. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. – М.: Наука, 1984г. – 264 с.
4. Саверенский Е.Ф. Сейсмические волны. - М.: Недра, 1972г. - 293 с.
5. Сатыбаев А.Дж. Алгоритм решения двумерно-линеаризованной обратной задачи сейсмики //Вопросы функционально-дифференциальных уравнений.– Ош: ОВК, 1999г.- С.41-46.